

18. SÍNDROME DE LA INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA VIH/SIDA

Definición:

La infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana, se caracteriza clínicamente por una infección asintomática durante un período variable de tiempo debido al equilibrio que se produce entre replicación viral y respuesta inmunológica del paciente. En etapas avanzadas de la infección se rompe este equilibrio aumentando la Carga Viral (CV) y deteriorándose la función inmune, lo que permite la aparición de diversas infecciones, clásicas y oportunistas y tumores con lo que se llega a la etapa de SIDA (Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida).

Patologías Incorporadas:

Quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- Infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)
- Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)

a. Acceso:

Todo beneficiario:

- Con sospecha clínica tendrá acceso a examen para el diagnóstico de la infección por VIH.
- Con confirmación diagnóstica o indicación médica, tendrá acceso a exámenes, a los esquemas de tratamiento antirretroviral según Listado de Prestaciones Específico y Norma de Carácter Técnico Médico y Administrativo, y a seguimiento.
- Embarazada VIH (+) y Recién Nacido hijo de madre VIH (+), tendrán acceso a protocolo para Prevención de Transmisión Vertical
- En tratamiento, tendrá acceso a continuarlo con los esquemas de tratamiento antirretroviral.

b. Oportunidad:

> Diagnóstico:

- Dentro de 60 días desde la sospecha

> Tratamiento:

- Inicio o cambio precoz, dentro de 7 días desde indicación médica, según criterios establecidos en la Norma de carácter Técnico, Médico y Administrativo.
- Cambio no precoz, dentro de 35 días desde indicación médica, según criterios establecidos en la Norma de carácter Técnico, Médico y Administrativo.

> Tratamiento en embarazadas VIH (+) y recién nacido hijo de madre VIH (+):

- Embarazadas: Tratamiento Antirretroviral (TAR) dentro de 7 días desde indicación médica.
- Recién nacido: Inicio de tratamiento antirretroviral dentro de 6 horas de nacido.
- Recién nacido: Inicio inmediato fórmula láctea de inicio.
- Parto: Inicio de tratamiento antirretroviral 4 horas antes de cesárea programada o desde el inicio del trabajo de parto, si fuera vaginal.
- Puerpéra: Inicio de medicamentos para la interrupción de la producción de leche materna dentro de 6 horas del nacimiento.

c. Protección Financiera

N°	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$	
18	Síndrome de la inmunodeficiencia adquirida VIH/SIDA	Diagnóstico	Sospecha infección por VIH	Cada vez	6.080	20%	1.220	
			Sospecha infección por VIH en embarazadas	Cada vez	3.530	20%	710	
		Tratamiento	Exámenes de determinación carga viral	Cada vez	32.140	20%	6.430	
			Exámenes linfocitos T y CD4	Cada vez	43.890	20%	8.780	
			Exámenes resistencia genética en VIH/SIDA	Cada vez	280.830	20%	56.170	
			Evaluación pretratamiento con antirretrovirales	Cada vez	85.440	20%	17.090	
			Esquemas terapéuticos con antirretrovirales de inicio o sin fracasos previos en personas de 18 años y más	Mensual	121.930	20%	24.390	
			Esquemas terapéuticos con antirretrovirales de rescate en personas de 18 años y más	Mensual	351.590	20%	70.320	
			Esquemas terapéuticos con antirretrovirales para prevención transmisión vertical: embarazo	Por tratamiento completo	1.069.090	20%	213.820	
			Terapia antirretroviral para prevención transmisión vertical: parto	Por tratamiento completo	67.080	20%	13.420	
			Terapia para prevención transmisión vertical: recién nacido	Por tratamiento completo	355.050	20%	71.010	
			Terapia para prevención transmisión vertical: puerperio	Por tratamiento completo	5.670	20%	1.130	
			Terapia antirretroviral en personas menores de 18 años	Mensual	291.950	20%	58.390	
			Seguimiento	Seguimiento recién nacidos y niños expuestos al VIH (hijos de madres con VIH (+))	Por tratamiento completo	83.370	20%	16.670
				Seguimiento personas VIH (+) de 18 años y más con tratamiento antirretroviral	Mensual	6.880	20%	1.380
		Seguimiento personas VIH (+) menores de 18 años con tratamiento antirretroviral		Mensual	12.620	20%	2.520	