

## 18. SÍNDROME DE LA INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA VIH/SIDA

### **Definición:**

La infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana, se caracteriza clínicamente por una infección asintomática durante un período variable de tiempo debido al equilibrio que se produce entre replicación viral y respuesta inmunológica del paciente. En etapas avanzadas de la infección se rompe este equilibrio aumentando la Carga Viral (CV) y deteriorándose la función inmune, lo que permite la aparición de diversas infecciones, clásicas y oportunistas, y tumores con lo que se llega a la etapa de SIDA (Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida)

### **Patologías Incorporadas:**

Quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la terminología médica habitual:

- Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)
- Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)

### **a. Acceso:**

Todo beneficiario:

- Con sospecha clínica tendrá acceso a confirmación diagnóstica
- Con confirmación diagnóstica y/o indicación médica, tendrá acceso a exámenes, tratamiento y seguimiento
- Embarazada VIH (+) y Recién Nacido hijo de madre VIH (+), tendrán acceso a protocolo para Prevención de Transmisión Vertical
- En tratamiento, tendrá acceso a continuarlo en la medida que haya cumplido con los criterios de inicio o cambio de terapia antirretroviral vigente.

### **b. Oportunidad:**

> Diagnóstico:

- Dentro de 60 días desde la sospecha

> Tratamiento:

- Inicio o cambio precoz, dentro de 7 días desde indicación médica, según criterios establecidos en la Norma de carácter Técnico, Médico y Administrativo.
- Inicio y cambio no precoz, dentro de 35 días desde indicación médica, según criterios establecidos en la Norma de carácter Técnico, Médico y Administrativo.

> Tratamiento en embarazadas VIH (+) y recién nacido hijo de madre VIH (+):

- Embarazadas: Dentro de 7 días desde indicación médica, según criterios establecidos en la Norma de carácter Técnico, Médico y Administrativo.
- Recién nacido: Dentro de 24 horas de nacido (inmediato)
- Parto: Inicio de tratamiento antirretroviral desde indicación médica (inmediato)
- Suspensión de lactancia en puérperas: Dentro de 24 horas del nacimiento (inmediato)

### c. Protección Financiera:

N°	Problema de Salud	Tipo de Intervención Sanitaria	Prestación o Grupo de Prestaciones	Periodicidad	Arancel	Copago %	Copago \$
18	SÍNDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA VIH/SIDA	Diagnóstico	Sospecha infección por VIH	cada vez	5.580	20%	1.120
		Tratamiento	Exámenes de Determinación Carga Viral	cada vez	29.520	20%	5.900
			Exámenes Linfocitos T y CD4	cada vez	40.320	20%	8.060
			Exámenes Genotipificación	cada vez	295.560	20%	59.110
			Antiretrovirales esquemas primera línea personas de 18 años y más	mensual	163.060	20%	32.610
			Antiretrovirales esquemas rescate personas de 18 años y más	mensual	309.440	20%	61.890
			TARV prevención transmisión vertical	por tratamiento completo	1.168.500	20%	233.700
			Antiretrovirales personas menores de 18 años	mensual	268.220	20%	53.640
		Seguimiento	Seguimiento recién nacidos y niños expuestos al VIH (hijos de madres con VIH(+))	por tratamiento completo	76.590	20%	15.320
			Seguimiento personas VIH (+) sin tratamiento antiretroviral	mensual	6.520	20%	1.300
			Seguimiento personas VIH adultos (+) con tratamiento antiretroviral	mensual	6.020	20%	1.200
			Seguimiento personas VIH menores de 18 años (+) con tratamiento antiretroviral	mensual	11.420	20%	2.280